

**URBANYL** Siehe Clobazam

**URIN, URIN STATUS (Qualitativ Tests + Sediment)**

**Probenmaterial:** 20 ml Urin. Erster Morgenurin

**URIN-KULTUR**

**Probenentnahme:** Der Nativ-Urin muss innerhalb von 3 Stunden nach dem Wasserlassen im Labor sein. Ansonsten einen Uricult anlegen. Vorbereitung: siehe § 3.4.5, Urin-Bakteriologie

**Probenmaterial:** 10 ml spontan Urin

**URIN; MYKOBAKTERIEN IM**

Siehe Tuberkulose

**URIN PARASITEN**

**Schistosomen Eier**

**Trichomonas**

**Mikrofilarien**

**Probenmaterial:** Urin (Probenentnahme im Labor wünschenswert)

**URIN SEDIMENT**

**Referenzbereich:**

Erythrozyten 0 – 5 / Feld

Leukozyten 0 – 5 / Feld

Mucus Negativ

Bakterien Negativ

Zylinder Negativ

Zellen Negativ

**Methode:** Zentrifugation und mikroskopische Beurteilung des Sediments

**Probenentnahme:** Spontanurin, erster Morgenurin

**Probenmaterial:** Frischer Urin 10 ml

**Frequenz:** Routineanalyse

**UROBILINOGEN**

**Referenzbereich:**

Männer und Frauen normal

**Methode:** Teststreifen,

**Probenentnahme:** Spontanurin, erster Morgenurin

**Probenmaterial:** Urin, 10 ml

**Frequenz:** Routineanalyse

**UROPORPHYRIN**

Siehe Porphyrine